

Zelena prognoza za 26.3.2019. - O STANJU U ZASADIMA KRUŠAKA

FAZE RAZVOJA KRUŠAKA

NA PODRUČJU VOJVODINE KRUŠKE SE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA I REGIONA NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA, OD FAZE POČETAK RAZVOJA LISTOVA DO FAZE RAZVIJENI ZELENI CVETNI PUPOLJCI.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA KRUŠKE

OBIČNA KRUŠKINA BUVA (*Cacopsylla pyri*)

OBIČNA KRUŠKINA BUVA JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA KRUŠAKA U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA. GLAVNI JE PROBLEM U INTENZIVNOJ PROIZVODNJI, A ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SISAJU SOKOVE BILJAKA I LUČE VELIKE KOLIČINE MEDNE ROSE. PRISUTNA MEDNA ROSA NA LASTARIMA, LISTOVIMA I PLODOVIMA SMANJUJE ASIMILACIONU POVRŠINU I OMOGUĆAVA NASELJAVANJE GLJIVE ČAĐAVICE, A SVE UTIČE NA SMANJENJE PRINOSA I SMANJENJE TRŽIŠNE VREDNOSTI PLODOVA. U REGIJAMA SA INTENZIVNOM PROIZVODNOM KRUŠAKA, OBIČNA KRUŠKINA BUVA JE NAJZNAČAJNIJI LIMITIRAJUĆI FAKTOR U PROIZVODNJI PLODOVA VISOKOG KVALITETA.

STANJE U ZASADIMA KRUŠAKA

U ZASADIMA KRUŠAKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO ISPIJENIH LARVI OBIČNE KRUŠKINE BUVE. KOD SORATA GDE JE DOŠLO DO POJAVE CVETNIH PUPOLJAKA LARVE SE NALAZE U OSNOVI LISNIH I CVETNIH DRŠKI I NA NALIČJU MLADIH LISTOVA. U TOKU JE PILJENJE LARVI PREZIMLJUJUĆE GENERACIJE.



SLIKA 2. LARVA OBIČNE KRUŠKINE BUVE



SLIKA 3. LARVE MLAĐEG RAZVOJNOG STUPNJA OBIČNE KRUŠKINE BUVE



SLIKA 4. LARVA MLAĐEG RAZVOJNOG STUPNJA OBIČNE KRUŠKINE BUVE

PREPORUKA

PREPORUČUJE SE PREGLED KRUŠAKA NA PRISUSTVO LARVI OBIČNE KRUŠKINE BUVE. UKOLIKO SE REGISTRUJE NJIHOVO PRISUSTVO, PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG PREPARATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
VERTIMEC 018-EC, ABASTATE, KRAFT 1,8 EW, GAT VERTIS 1,8 CS	ABAMEKTIN	0,15%

PREPORUČUJE SE I PRIMENA PREPARATA NA BAZI MINERALNOG ULJA U KONCENTRACIJI OD 0,3%.

PRIMENA INSEKTICIDA JE ZABRANJENA U FAZI CVETANJA!

KOD SORTI KOJE SE NALAZE U FAZI CVETANJA, HEMIJSKE MERE ZAŠTITE SE NE PREPORUČUJU!

TAKOĐE, PAŽNJU TREBA OBRATITI I NA KOROVE KOJI SU PRISUTNI U VOĆNJACIMA I NA KOJIMA SE NALAZE PČELE I DRUGI POLINATORI. PRE PRIMENE INSEKTICIDA, TREBA UNIŠTITI CVETAJUĆE KOROVE U ZASADIMA I OKO NJIH.

PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA TREBA SE PRIDRŽAVATI UPUTSTVA ZA UPOTREBU I PREDUZETI SVE MERE U CILJU ZAŠTITE OPRAŠIVAČA.



SLIKA 5. PČELA NA MASLAČKU