

O STANJU U USEVIMA JEČMA

FAZE RAZVOJA JEČMA

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI JEČMA SE NALAZE U FAZI OD POJAVE LISTA ZASTAVIČARA DO FAZE VIDLJIVO PRVO OSJE.

STANJE U USEVIMA JEČMA

PRE NEDELJU DANA INFORMISALI SMO VAS O PRISUSTVU SIMPTOMA RAMULARIOZNE PEGAVOSTI LISTA JEČMA, O POSTIZANJU EPIDEMIJSKIH PRAGOVA I POTREBI SPROVEDENJA MERA ZAŠTITE.

MEĐUTIM, TOKOM PROTEKLE NEDELJE KOJA JE OBILOVALA PADAVINAMA I BILA PRAĆENA NISKIM TEMPERATURAMA, ONEMOGUĆEN JE ULAZAK NA PARCELE JEČMA I SPROVOĐENJE MERA ZAŠTITE. NA TAKVIM USEVIMA I DALJE SE REGISTRUJE ŠIRENJE SIMPTOMA RAMULARIOZNE PEGAVOSTI LISTA. U CILJU SPREČAVANJA INFEKCIJE KLASA I KASNIJEG PRENOŠENJA OVOG PATOGENA SEMENOM, SADA JE NEOPHODNO SPREČITI DALJU INFEKCIJU BILJAKA. U TU SVRHU SISTEM PROGNOZE PREPORUČUJE SPROVOĐENJE HEMIJSKOG TRETMANA NA SVIM ONIM PARCELAMA GDE SE REGISTRUJE **5% BILJAKA SA SIMPTOMIMA RAMULARIOZNE PEGAVOSTI LISTA.**

POČETNI SIMPTOMI RAMULARIOZNE PEGAVOSTI SU SITNE TAMNE PEGE NA LISTOVIMA JEČMA. BROJ I VELIČINA PEGA ZAVISI OD INTENZITETA ZARAZE I OSETLJIVOSTI SORTE. PORED LISTA, MOŽE BITI ZARAŽENO STABLO I KLAS. GLJIVA STVARA TOKSINE, RUBELINE, TAKO DA VEOMA BRZO DOLAZI DO SUŠENJA ZARAŽENIH DELOVA PA I ČITAVIH LISTOVA ILI BILJAKA.



SLIKA 1. SIMPTOMI RAMULARIOZNE PEGAVOSTI NA LISTOVIMA JEČMA



SLIKA 2. SIMPTOM RAMULARIOZNE PEGAVOSTI NA LISTU JEČMA



SLIKA 3. SIMPTOM RAMULARIOZNE PEGAVOSTI NA LISTU JEČMA

PREPORUKA

U USEVIMA JEČMA ZA SUZBIJANJE RAMULARIUZNE PEGAVOSTI LISTA PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
KARIKA	HLOTALONIL+PROPIKONAZOL	2 L/HA
DUETT ULTRA	EPOSIKONAZOL+TIOFANAT-METIL	0,4-0,6 L/HA