

Zelena prognoza za 26.4.2019. - O STANJU U ZASADIMA VINOVE LOZE

FAZE VINOVE LOZE

NA PODRUČJU VOJVODINE, U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA I LOKALITETA, VINOVA LOZA SE NALAZI U FAZI OD TRI-ŠEST RAZVIJENIH LISTOVA DO FAZE CVAST JASNO VIDLJIVA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA VINOVE LOZE, FRUŠKOGORSKO VINOGORJE

CRNA PEGAVOST VINOVE LOZE (*Phomopsis viticola*)

CRNA PEGAVOST VINOVE LOZE JE BOLEST KOJA SE REDOVNO JAVLJA U NAŠIM VINOGORJIMA. SIMPTOMI PRISUSTVA OVE GLJIVE NAJJASNIJE SE UOČAVAJU U PROLEĆE. ZARAŽENI LASTARI SE PO BOJI KORE RAZLIKUJU OD ZDRAVIH, ONI SU SIVOBELE BOJE SA VELIKIM BROJEM CRNIH PIKNIDA-PLODONOSNIH TELA. LASTARI SU OŠTEĆENI U OSNOVI, DOLAZI DO NJHOVOG PRSTENOVANJA I LOMLJENJA, CVASTI I GROZDOVI SE SUŠE. NAPADNUTA LOZA SLABIJE DOZREVA I LAKŠE IZMRZAVA U TOKU ZIME.

U POČETKU RAZVOJA VINOVE LOZE I U VLAŽNIM USLOVIMA IZ PIKNIDA CURE SPORE KOJE VRŠE INFEKCIJU MLADOG ZELENOG TKIVA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA VINOVE LOZE REGISTRUJE SE DOMINANTNO PRISUSTVO NEAKTIVIRANIH PIKNIDA, A IZ KOJIH ĆE U USLOVIMA VLAŽENJA DOĆI DO OSLOBAĐANJA PIKNOSPORA.



SLIKA 2. SIMPTOMI CRNE PEGAVOSTI VINOVE LOZE NA LASTARU



SLIKA 3. SIMPTOMI CRNE PEGAVOSTI VINOVE LOZE NA LASTARU



SLIKA 4. PIKNIDI CRNE PEGAVOSTI NA KORI LASTARA

PREPORUKA

U ZASADIMA GDE SU REGISTROVANI SIMPTOMI OVOG PATOGENA PREPORUČUJE SE PREVENTIVNI TRETMAN PRIMENOM NEKOG OD SLEDEĆEG FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
FOLPAN 50-WP	FOLPET	0,2%
MANKOGAL-80	MANKOZEB	0,2-0,25%

TRETMAN IZVRŠITI PRE NAJAVLJENIH PADAVINA.