

O STANJU U ZASADIMA JABUKA

FAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE JABUKE SE NALAZE U FENOFAZAMA RAZVOJA PLODA, OD FAZE DRUGO OPADANJE PLODOVA DO FAZE PREČNIK PLODA DO 40 MM.



SLIKA1-FAZA RAZVOJA JABUKE, SORTA AJDARED

JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)

JABUKIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA JABUKE. U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI GENERACIJE GODIŠNJE.

U ZASADIMA JABUKA NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE **PERIOD INTENZIVNOG PILJENJA LARVI PRVE GENERACIJE**. TO JE KRITIČAN PERIOD ZA KONTROLU OVE ŠTETOČINE KADA JE POTREBNO IZVRŠITI HEMIJSKE MERE SUZBIJANJA.



SLIKA2-JAJA JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODOVIMA I LISTU JABUKE

PREPORUKA

U CILJU ZAŠTITE PLODOVA JABUKE OD LARVI JABUKINOG SMOTAVCA PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA LARVICIDNOG DELOVANJA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
MOSPILAN 20-SP	ACETAMIPRID	0,025%
PYRINEX 25 CS	HLORPIRIFOS	0,2-0,25%
LANNATE-90	METOMIL	0,035-0,045%
NURELLE-D	HLORPIRIFOS+CIPERMETRIN	0,075-0,1%

ČAĐAVA KRASTAVOST JABUKE (*Venturia inaequalis*)

STRATEGIJA ZAŠTITE JABUKE OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE KRASTAVOSTI ZASNIVA SE NA SPREČAVANJU PRIMARNIH INFEKCIJA U PRVOM DELU VEGETACIJE.

NA PODRUČJU VOJVODINE JOŠ UVEK TRAJE PERIOD PRIMARNIH ZARAZA I U PSEUDOTECIJAMA SE JOŠ UVEK REGISTRUJE PRISUSTVO ASKOSPORA.



SLIKA3-SIMPTOMI ČAĐAVE PEGAVOSTI NA LISTU JABUKE

PREPORUKA

NASTAVITI ZAŠTITU JABUKA OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE KRASTAVOSTI JABUKE REGISTROVANIM FUNGICIDIMA.

PEPELNICA JABUKE (*Podosphaera leucotricha*)

U ZASADIMA JABUKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO SIMPTOMA PEPELNICE. USLOVI U KOJIMA SE NALAZIMO SU VEOMA POVOLJNI ZA RAZVOJ OVOG PATOGENA, A TO SU RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA VIŠA OD 60% I TEMPERATURE OD 15 DO 25°C.



SLIKA4-SIMPTOMI PEPELNICE JABUKE

PREPORUKA

U ZASADIMA SA OSETLJIVIM SORTAMA NA PEPELNICU JABUKE PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
KOSSAN-WG	SUMPOR	0,3-0,5%
TOPAS 100-EC	PENKONAZOL	0,04%
LUNA EXPIRIENCE	TEBUKONAZOL+FLUOPIRAM	0,075%