

Zelena prognoza za 26.6.2019. - O STANJU U USEVIMA BRESAKA I NEKTARINA

FAZE BRESAKA I NEKTARINA

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE BERBA SREDNJESTASNIH SORTI BRESAKA I NEKTARINA, DOK SE KASNOSTASNE SORTE NALAZE U FAZI POČETAK OBOJAVANJA PLODA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA NEKTARINE

BRESKVIN SMOTAVAC (*Cydia molesta*)

BRESKVIN SMOTAVAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI VOĆA NA NAŠIM PROSTORIMA. NAJVEĆE ŠTETE PRIČINJAVA U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA, A MOŽE PROUZROKOVATI ŠTETE I NA ŠLJIVAMA, KAJSIJAMA, JABUKAMA, KRUŠKAMA I DUNJAMA.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U VRHOVE LASTARA ILI U PLODOVE. NA MESTU ULAZA LARVE U PLOD MOŽE SE VIDETI SMOLOTOČINA KOJA CURI IZ PLODA I TAKVI PLODOVI OTPADAJU PRE VREMENA.



SLIKA 2. UBUŠENJE NA PLODU BRESKVE OD LARVE BRESKVINOG SMOTAVCA

U VIZUELNIM PREGLEDIMA REGISTRUJE SE PRISUSTVO JAJA RAZLIČITIH RAZVOJNIH STADIJUMA NA NALIČJU LISTOVA. NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE PILJENJE LARVI DRUGE GENERACIJE BRESKVINOG SMOTAVCA.

TRIPSI (*Thysanoptera*)

U POSLEDNJIH NEKOLIKO GODINA, PRISUTNA JE PROGRESIJA TRIPSA NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU. OD VOĆNIH VRSTA, TRENUTNO SU NAJUGROŽENIJE BRESKVE, NEKTARINE I JABUKE.

VIZUELNIM PRREGLEDIMA ZASADA BRESAKA I NEKTARINA REGISTRUJE SE PRISUSTVO TRIPSA NA LISTOVIMA I PLODOVIMA.



SLIKA 3. ODRASLE JEDINKE TRIPSA



SLIKA 4. ODRASLA JEDINKA TRIPSA NA PLODU

ŠTETE OD TRIPSA NASTAJU USLED ISHRANE LARVI I ODRASLIH JEDINKI KAO I USLED PROCESA POLAGANJA JAJA. NA NAPADNUTIM PLODOVIMA DOLAZI DO POJAVE SIMPTOMA OŠTEĆENJA U VIDU RAZLIČITIH NEKROZA I DEFORMITETA.



SLIKA 5. SIMPTOM OŠTEĆENJA OD TRIPSA NA BRESKVAMA

PREPORUKA

INDIREKTNE ŠTETE KOJE OVI ŠTETNI ORGANIZMI NANOSE POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI SU VEOMA ZNAČAJNE. BRESKVIN SMOTAVAC I NEKE VRSTE TRIPSA KOJE SU PRISUTNE U SRBIJI IMAJU KARANTINSKI STATUS U POJEDINIM ZEMLJAMA GDE SE IZVOZI NAŠE VOĆE.

PROIZVOĐAČIMA KASNOSTASNOG SORTIMENTA BRESAKA I NEKTARINA SE PREPORUČUJE OBILAZAK ZASADA. UKOLIKO SE REGISTRUJE PRISUSTVO NAVEDENIH ŠTETOČINA PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
EXIREL	CIJANTRANILIPROL	0,075 – 0,1%

**U ZASADIMA U KOJIMA JE U TOKU BERBA NE TREBA PRIMENJIVATI HEMIJSKE MERE ZAŠTITE!
OBAVEZNO TREBA VODITI RAČUNA O KARENCI, KOJA ZA NAVEDENI INSEKTICID IZNOSI 7
DANA.**