

Zelena prognoza za 26.7.2019. - O STANJU U ZASADIMA VINOVE LOZE

FAZE VINOVE LOZE

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI VINOVE LOZE SE NALAZE U FAZI OD POTPUNOG DODIRIVANJA BOBICA DO POČETKA SAZREVANJA-BOBICE SU U FAZI ŠARKA.



SLIKA 1. FAZA VINOVE LOZE, FRUŠKOGORSKO VINOGRORJE, SORTA FRANKOVKA

PEPELNICA VINOVE LOZE (*Uncinula necator*)

PEPELNICA VINOVE LOZE SE JAVLJA REDOVNO U NAŠIM VINOGRADARSKIM REGIJAMA. U USLOVIMA POVOLJNIM ZA NJEN RAZVOJ, KOJI SE BELEŽE I OVE VEGETACIJE, MOŽE BITI VEOMA ŠTETNO OBOLJENJE I VODI KA SMANJENJU PRINOSA.

SADA JE VEOMA VAŽNO ZAŠTITITI GROZDOVE OD OVOG PATOGENA, JER KADA SE SIMPTOMI JEDNOM POJAVE NA BOBICAMA, NE POSTOJI DOVOLJNO VISOKO EFIKASAN FUNGICID KOJI MOŽE DA SUZBIJE PEPELNICU NA GROZDU.



SLIKA 2. SIMPTOMI PEPELNICE NA GROZDU

PREPORUKA

ZA ZAŠTITU VINOGRADA OD PROUZROKOVAČA PEPELNICE PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD FUNGICIDA NA BAZI SUMPORA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA	KARENCA
KUMULUS DF, KOSSAN WG, WEBESAN WG	SUMPOR	0,3-0,5%	28 DANA

SIVA TRULEŽ GROŽĐA (*Botrytis cinerea*)

U FAZI POČETKA SAZREVANJA VINOVE LOZE-BOBICE U FAZI ŠARKA, SPROVODI SE TRETMAN U CILJU SUZBIJANJA PROUZROKOVAČA SIVE TRULEŽI GROŽĐA. U OVOJ FAZI BOBICE OMEKŠAVAJU, KOLIČINA ŠEĆERA SE POVEĆAVA I GLJIVA MOŽE DIREKTNO DA PRODRE U BOBICE. TAKOĐE, DODATNI RIZIK ZA POJAVU OVOG PATOGENA PREDSTAVLJA AZIJSKA VOĆNA MUŠICA ČIJA POJAVA JE REGISTROVANA U LOVNIM KLOPKAMA U VINOGRADIMA. NA MESTIMA GDE ŽENKE ZASECAJU POKOŽICU BOBICA DA BI UBACILE JAJA, OTVARA SE PUT ZA ULAZ GLJIVE.



SLIKA 3. LOVNA KLOPKA ZA AZIJSKU VOĆNU MUŠICU

SIVA TRULEŽ GROŽĐA JE DVOSTRUKO ŠTETNA, UTIČE NA SMANJENJE PRINOSA JER DOLAZI DO TRULEŽI BOBICA ILI CELIH GROZDOVA I UTIČE NA SMANJENJE KVALITETA VINA.



SLIKA 4. SIMPTOMI SIVE TRULEŽI GROŽĐA

PREPORUKA

S OBZIROM NA NAJAVU PADAVINA, U CILJU SPREČAVANJA RAZVOJA PROUZROKOVAČA SIVE TRULEŽI, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA	KARENCA
SWITCH 62,5-WG	CIPRODINIL+FLUDIOKSONIL	0,6-0,8 KG/HA	28 DANA
PYRUS 400 SC	PIRIMETANIL	2,5 L/HA	35 DANA

AZIJSKA VOĆNA MUŠICA (*Drosophila suzukii*)

PRE DESET DANA SMO VAS OBAVESTILI O PRVIM ULUVIMA ODRASLIH JEDINKI AZIJSKE VOĆNE MUŠICE U VINOGRADIMA NA PODRUČJU VOJVODINE. SADA JE KLJUČNO SPREČITI DRASTIČNO PODIZANJE POPULACIJE OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 5. ŽENKA I MUŽJAK AZIJSKE VOĆNE MUŠICE

PREPORUKA

PORED POSTAVLJANJA KLOPKI SA CRNIM VINOM I JABUKOVIM SIRČETOM RADI MASOVNOG IZLOVLJAVANJA, PREPORUČUJE SE I PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE U CILJU SMANJENJA POPULACIJE AZIJSKE VOĆNE MUŠICE:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA	KARENCA
LAMDEX	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,06-0,07 L/HA	21 DAN

PRILIKOM PRIMENE HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE OBAVEZNO SE MORA VODITI RAČUNA O KARENCI PRIMENJENIH PREPARATA. FUNGICIDI KOJI SE KORISTE ZA SUZBIJANJE SIVE TRULEŽI MOGU UTICATI NA KVALITET FERMENTACIJE KAO I NA KVALITET VINA. ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA, TRETMAN JE NAJBOLJE SPROVESTI U VEČERNJIM SATIMA, KADA TEMPERATURE VAZDUHA PADNU ISPOD 25°C.