

## Zelena prognoza za 27.3.2018. - o preduzimanju mera zaštite u zasadima bresaka i nektarina

### FENOFAZE RAZVOJA BRESAKA I NEKTARINA

NA PODRUČJU VOJVODINE, BRESKVE I NEKTARINE NALAZE SE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA U ZAVISNOSTI OD REGIONA, EKSPozICIJE TERENA I SORTIMENTA.

SORTE RANIH GRUPA ZRENJA NALAZE SE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA CVETNIH PUPOLJAKA, OD FAZE CVETNA LOŽA OTVORENA, KRUNIČNI LISTIĆI VIDLJIVI (JOŠ UVEK ZATVORENI) DO FAZE PRVI CVETOV I OTVORENI.


SORTE KASNIH GRUPA ZRENJA NALAZE SE U FAZI OD BUBRENJA LISNIH PUPOLJAKA DO ZELEN I USKI LISTIĆI VIDLJIVI.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA BRESKVE (RANOSTASNI SORTIMENT)



SLIKA 2. FAZA RAZVOJA BRESKVE (RANOSTASNI SORTIMENT)



SLIKA 3. FAZA RAZVOJA BRESKVE (KASNOSTASNI SORTIMENT)



SLIKA 4. FAZA RAZVOJA BRESKVE (SREDNJESTASNI SORTIMENT)

NAJAVLJEN PORAST TEMPERATURA SA PADAVINAMA ZA OVU NEDELJU, MOŽE STVORITI POVOLJNE USLOVE ZA OSTVARENJE INFEKCIJA OD PROUZROKOVAČA DVA VEOMA ZNAČAJNA OBOLJENJA U PROIZVODNJI BRESAKA I NEKTARINA.

**1. KOD RANOSTASNOG SORTIMENTA KOJI SE NALAZI U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA CVETNIH PUPOLJAKA MOŽE DOĆI DO INFEKCIJA OD PROUZROKOVAČA SUŠENJA CVETOVA, GRANČICA I MRKE TRULEŽI PLODOVA KOŠTIČAVOG VOĆA (*Monilia laxa*).**

INFEKCIJA CVETA SE OSTVARUJE PREKO ŽIGA TUČKA, A POVOLJNI USLOVI ZA OSTVARENJE INFEKCIJE I BRZU POJAVU BOLESTI SU PRISUSTVO PADAVINA ILI VISOKA RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA (85%) I TEMPERATURA OKO 20°C. UKOLIKO JE VEĆ OSTVARENA INFEKCIJA NEMOGUĆE JE SPREČITI RAZVOJ SIMPTOMA PRIMENOM FUNGICIDA, TE JE NEOPHODNO SPOROVESTI PREVENTIVNE MERE ZAŠTITE.

#### **PREPORUKA**

KOD RANOSTASNIH SORTI KOJE SE NALAZE U FAZI POČETKA CVETANJA, PRED NAJAVLJENE PADAVINE PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG FUNGICIDA:

<b>PREPARAT</b>	<b>AKTIVNA MATERIJA</b>	<b>KONCENTRACIJA</b>
CIPRODEX	CIPRODINIL	0.05%

**2. KOD SREDNJESTASNOG I KASNOSTASNOG SORTIMENTA, GDE SE JOŠ UVEK REGISTRUJU BOČNI PUPOLJCI U FAZI BUBRENJA I OTVARANJA, MOŽE DOĆI DO INFEKCIJE PROUZROKOVAČEM KOVRDŽAVOSTI LISTA BRESKVE (*Taphrina deformans*).**

OVA GLJIVA OSTVARUJE SAMO PRIMARNE INFEKCIJE. RAZVOJEM BILJAKA TKIVO POSTAJE OTPORNO NA OVOG PATOGENA ŠTO ONEMOGUĆAVA SEKUNDARNE INFEKCIJE.

#### **PREPORUKA**

KOD KASNOSTASNIH SORTI KOJE SE JOŠ UVEK NALAZE U FAZI BUBRENJA I OTVARANJA PUPOLJAKA, PRED NAJAVLJENE PADAVINE, PREPORUČUJE SE PRIMENA REGISTROVANOG FUNGICIDA ZA SUZBIJANJE KOVRDŽAVOSTI LISTA BRESKVE:

<b>PREPARAT</b>	<b>AKTIVNA MATERIJA</b>	<b>KONCENTRACIJA</b>
CIRAM S 75	CIRAM	0.25-0.35%



SLIKA 5. SIMPTOMI KOVRDŽAVOSTI U VEGETACIJI



SLIKA 6. SIMPTOMI KOVRDŽAVOSTI U VEGETACIJI