

## O STANJU U ZASADIMA JABUKA

### FENOFAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI JABUKA SE NALAZE U POČETNIM FAZAMA RAZVOJA PLODOVA, PLODOVI SU DOSTIGLI DIMENZIJE DO 10 MILIMETARA.



SLIKA1-FAZA RAZVOJA JABUKA

### ČAĐAVA PEGAVOST LISTA I KRSTAVOST PLODOVA JABUKE (*Venturia inaequalis*)

PERIOD PRIMARNIH INFEKCIJA OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE JE U TOKU. PROCES DOZREVANJA PSEUDOTECIJA U OVOJ PROIZVODNOJ SEZONI JE POČEO KASNIJE U ODNOSU NA PRETHODNIH NEKOLIKO GODINA ŠTO JE POSLEDICA IZUZETNO NISKIH TEMPERATURA TOKOM ZIME I RANOG PROLEĆA. PROCES PRAŽNENJA PSEUDOTECIJA ODNOSNO OSLOBAĐANJA ASKOSPORA JE NA SAMOM POČETKU TAKO DA SE U JABUČNJACIMA REGISTRUJE VISOK NIVO INFEKTIVNOG MATERIJALA OVOG PATOGENA. SA SVAKIM PADAVINAMA MOŽE SE OČEKIVATI OSLOBAĐANJE VELIKOG BROJA ASKOSPORA I VISOK RIZIK OD INFEKCIJA PROUZROKOVAČEM ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE.

## PREPORUKA

PRED NAJAVLJENE PADAVINE NEOPHODNO JE ZAŠTITI ZASADE JABUKA PRIMENOM PREVENTIVNIH PREPARATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
ANTRACOL 70-WG, NIJANSA-WG	PROPINEB	2 KG/HA

## PEPELNICA JABUKE (*Podosphaera leucotricha*)

U ZASADIMA JABUKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO SIMPTOMA PEPELNICE. USLOVI U KOJIMA SE NALAZIMO SU VEOMA POVOLJNI ZA RAZVOJ OVOG PATOGENA, A TO SU RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA VIŠA OD 60% I TEMPERATURE OD 15 DO 25°C.



SLIKA 2. SIMPTOM PEPELNICE JABUKE

## PREPORUKA

U ZASADIMA SA OSETLJIVIM SORTAMA NA PEPELNICU JABUKE PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
KOSSAN-WG, KUMULUS-DF, WETSUL	SUMPOR	0,3-0,5%