

O STANJU U ZASADIMA JABUKA

FAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE JABUKE SE NALAZE U FAZI PORASTA PLODOVA KOJI SU DOSTIGLI OD 50 DO 70% KRAJNJE VELIČINE.



SLIKA 1. FAZE RAZVOJA JABUKE

JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)


JABUKIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA JABUKE. U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE I ISHRANJUJU MESOM PLODA I SEMENKAMA. NAPADNUTI PLODOVI PREVREMENO OTPADAJU I GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

U SVIM REGIONIMA VOJVODINE U TOKU JE LET LEPTIRA DRUGE GENERACIJE OVE ŠTETOČINE.

NA PLODOVIMA SE REGISTRUJU POLOŽENA JAJA RAZLIČITIH STADIJUMA RAZVOJA. PRISUTNA SU SVEŽE POLOŽENA-BELA JAJA, JAJA U RAZVOJU-SA CRVENIM OREOLOM I JAJA NEPOSREDNO PRED PILJENJE – JAJA SA CRNOM GLAVOM.

U ZASADIMA JABUKA NA PODRUČJU VOJVODINE ZAPOČEO JE PERIOD PILJENJA LARVI DRUGE GENERACIJE JABUKINOG SMOTAVCA.



SLIKA 2. JAJA JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODOVIMA JABUKE

PREPORUKA

U CILJU ZAŠTITE PLODOVA JABUKE OD JABUKINOG SMOTAVCA PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA OVICIDNO-LARVICIDNOG DELOVANJA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
CORAGEN 20 SC	HLORANTRANILIPROL	0,016-0,02%

ČAĐAVA PEGAVOST LISTOVA I KRSTAVOST PLODOVA JABUKE (*Venturia inaequalis*)

ČAĐAVA PEGAVOST LISTOVA I KRSTAVOST PLODOVA JABUKE JE NAJZNAČAJNIJI PATOGEN U PROIZVODNJI JABUKA. STRATEGIJA ZAŠTITE JABUKA OD OVOG PATOGENA ZASNIVA SE NA SPREČAVANJU PRIMARNIH INFEKCIJA U PRVOM DELU VEGETACIJE.

NA PODRUČJU VOJVODINE ZAVRŠEN JE PERIOD PRIMARNIH ZARAŽENOSTI, ISPRAŽNJENOST PSEUDOTECIJA IZNOSI 100%.

SAMO U ZASADIMA GDE NISU SPROVEDENE ADEKVATNE MERE ZAŠTITE U PRVOM DELU VEGETACIJE I GDE SE REGISTRUJU SIMPTOMI OVOG PATOGENA, NEOPHODNO JE NASTAVITI SA HEMIJSKOM KONTROLOM KAKO BI SE SPREČILE SEKUNDARNE INFEKCIJE.

PEPELNICA JABUKE (*Podosphaera leucotricha*)

U ZASADIMA JABUKA SA OSETLJIVIM SORTIMENTOM REGISTRUJE SE PRISUSTVO SIMPTOMA PEPELNICE. USLOVI U KOJIMA SE NALAZIMO SU POVOLJNI ZA RAZVOJ OVOG PATOGENA.



SLIKA 3. SIMPTOM PEPELNICE JABUKE

PREPORUKA

ZA SUZBIJANJE PEPELNICE JABUKE PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
TOPAS 100-EC	PENKONAZOL	0,04%
IMPACT 25 SC	FLUTRIAFOL	0,02%