

O stanju u zasadima bresaka i nektarina

FENOFAZE BRESKVE I NEKTARINE

NA PODRUČJU VOJVODINE KASNE SORTE BRESKVE I NEKTARINE NALAZE SE U FAZI OBOJAVANJA PLODA.



SLIKA1-FAZA RAZVOJA KASNE SORTE NEKTARINE-INDIPENDENT

BRESKVIN SMOTAVAC (*Cydia molesta*)

BRESKVIN SMOTAVAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI VOĆA NA NAŠIM PROSTORIMA. NAJVEĆE ŠTETE PRIČINJAVA U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA, A MOŽE PROUZROKOVATI ŠTETE I NA ŠLJIVAMA, KAJSIJAMA, JABUKAMA, KRUŠKAMA I DUNJAMA.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U VRHOVE LASTARA ILI U PLODOVE.

PORED DIREKTNIH ŠTETA USLED ISHRANE LARVI, VEOMA ZNAČAJNE SU I INDIREKTNE ŠTETE KOJE PROUZROKUJE BRESKVIN SMOTAVAC. PRISUSTVO OVE ŠTETOČINE U PLODOVIMA VOĆA MOŽE DA OGRANIČI IZVOZ, JER JE BRESKVIN SMOTAVAC KARANTINSKA ŠTETOČINA U NEKIM ZEMLJAMA GDE SE IZVOZI NAŠE VOĆE.



SLIKA1-LARVA BRESKVINOG SMOTAVCA U MLADARU



SLIKA2-UBUŠENJE NA PLODU NEKTARINE OD LARVE BRESKVINOG SMOTAVCA

U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA, BRESKVIN SMOTAVAC RAZVIJA ČETIRI GENERACIJE GODIŠNJE.

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE POČETAK PILJENJA LARVI TREĆE GENERACIJE BRESKVINOG SMOTAVCA.

PREPORUKA

PLODOVE KASNIH SORATA BRESAKA I NEKTARINA NEOPHODNO JE ZAŠTITITI OD UBUŠIVANJA LARVI BRESKVINOG SMOTAVCA. PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH PREPARATA UZ OBAVEZNO POŠTOVANJE KARENCE KOJA ZA NAVEDENE INSEKTICIDE IZNOSI 14 DANA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
KARATE ZEON	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,02%
FASTAC 10 EC	ALFA-CIPERMETRIN	0,012-0,015%
DECIS 2,5 EC	DELTAMETRIN	0,03-0,05%

PEPELNICA BRESKVE (*Sphaerotheca pannosa var.persicae*)

U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA REGISTRUJU SE SIMPTOMI PEPELNICE NA LISTOVIMA. GLJIVA KOJA PROUZROKUJE PEPELNICU NAPADA SVE ZELJASTE DELOVE, LIŠĆE, MLADARE, CVETOVE I PLODOVE. NA ZARAŽENIM DELOVIMA JAVLJA SE PEPELJASTO BELA MICELIJSKA PREVLAKA KOJU ČINE REPRODUKTIVNI ORGANI GLJIVE. PEPELNICA SE NAJČEŠĆE JAVLJA NA MLADOM LIŠĆU KOJE SE U POČETKU UVIJA, A PRI JAČOJ ZARAZI SE SUŠI I OPADA. NA PLODOVIMA, SIMPTOMI ZARAZE SE ISPOLJAVAJU U VIDU BELIČASTIH ILI SIVKASTIH PEGA.



SLIKA4-SIMPTOMI PEPELNICE NA LISTOVIMA BRESKVE

PREPORUKA

ZA SUZBIJANJE PEPELNICE U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA
PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG PREPARATA KOJI IMA KARENCU 7
DANA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
AKORD	TEBUKONAZOL	0,75 L/HA

.....