

O REPIČINOM SJAJNIKU

FAZE RAZVOJA ULJANE REPICE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ULJANE REPICE SE NALAZE U POČETNIM FAZAMA RAZVOJA CVETNIH PUPOLJAKA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA ULJANE REPICE

REPIČIN SJAJNIK (*Meligethes aeneus*)

REPIČIN SJAJNIK JE JEDNA OD NAJZNAČAJNIJIH ŠTETOČINA ULJANE REPICE. JAVLJA SE SVAKE GODINE U SVIM REGIONIMA GDE SE GAJI ULJANA REPICA. IMA JEDNU GENERACIJU GODIŠNJE I IMAGO PREZIMI U ZEMLJI. RANO U PROLEĆE, KADA TEMPERATURE PREĐU 12 °C IZLAZI IZ ZEMLJE I ODLAZI NA RAZNE KOROVE, PRVENSTVENO MASLAČAK. ČIM OTPOČNE FORMIRANJE PUPOLJAKA ULJANE REPICE PRELAZI NA NJU I ZAPOČINJE ISHRANU. INSEKTI BUŠE CVETNE PUPOLJKE I IZJEDAJU IH IZNUTRA DA BI DOŠLI DO POLENA KOJIM SE HRANE. OŠTEĆENI CVETNI PUPOLJCI SE VEĆINOM NE OTVARAJU, SUŠE SE I OTPADAJU. TAKOĐE, ŽENKE POLAŽU JAJA U PUPOLJKE I TO 1 DO 3 JAJETA U PUPOLJAK. LARVE SE HRANE POLENOM I DRUGIM DELOVIMA CVETA ŠTO POVEĆAVA ŠTETE NA ULJANOJ REPICI OD OVOG INSEKTA.

STANJE U USEVIMA ULJANE REPICE

TRENUTNO SE U USEVIMA ULJANE REPICE REGISTRUJE PRISUSTVO REPIČINOŠ SJAJNIKA. NA PARCELAMA GDE DO SADA NISU SPROVEDENE MERE ZAŠTITE OD REPIČINIPIPI, REGISTRUJU SE KRITIČNE BROJNOSTI OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 2. ODRASLE JEDINKE REPIČINOŠ SJAJNIKA NA CVASTI ULJANE REPICE



SLIKA3-ODRASLE JEDINKE REPIČINOG SJAJNIKA NA CVASTI ULJANE REPICE

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČIJE OBILAZAK USEVA ULJANE REPICE I UTVRĐIVANJE PRISUSTVA REPIČINOG SJAJNIKA. **UKOLIKO SE REGISTRUJE PRISUSTVO 0,5 DO 1 IMAGA REPIČINOG SJAJNIKA PO BILJCI ULJANE REPICE, PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA. PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE JE OPRAVDANA SAMO DO POČETKA CVETANJA ZBOG ZAŠTITE POLINATORA.**

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
DURBIN EW	CIPERMETRIN	0,3-0,6 L/HA
NURELLE-D	HLOPPIRIFOS + CIPERMETRIN	0,75-1 L/HA
MAVRIK-EW	TAU-FLUVALINAT	0,15-0,2 L/HA
KARATE ZEON	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,25-0,35 L/HA