

## Zelena prognoza za 28.3.2019. - ERIOFIDNA GRINJA LESKE

### FAZE RAZVOJA KOŠTIČAVOG VOĆA

NA PODRUČJU VOJVODINE, ZASADI LESKE SE NALAZE U FAZI OD PUCANJA LISNIH PUPOLJAKA DO VEĆINA LISTOVA OTVORENA.



SLIKA 1. ZASAD LESKE

### ERIOFIDNA GRINJA LESKE (*Phytoptus avellanae*)

ERIOFIDNA GRINJA LESKE JE ŠTETOČINA KOJA JE PRISUTNA SVUDA GDE SE GAJI LESKA. SIMPTOMI NAPADA OVE GRINJE SE UOČAVAJU NA PROLEĆE U VIDU NABUBRELIH I DEFORMISANIH PUPOLJAKA KOJI SE NE RAZVIJAJU ILI SE IZ NJIH RAZVIJAJU ZAKRŽLJALI IZDANCI.

TRENTNO SE U ZASADIMA LESKE MOGU UOČITI OVAKVI NABUBRELI PUPOLJCI. UNUTRAR NJIH SE NALAZI IZUZETNO VELIKI BROJ LARVI. LARVE SU ZAPETASTOG OBLIKA, VEOMA SITNE I TEŠKO SE UOČAVAJU GOLIM OKOM.

OVA ŠTETOČINA IMA VIŠE GENERACIJA GODIŠNJE. ŽENKE TOKOM PROLEĆA NAPUŠTAJU PUPOLJKE I NAPADAJU MLADO LIŠĆE.



SLIKA 2. ZDRAV I NAPADNUT PUPOLJAK LESKE



SLIKA 3. ZDRAV I NAPADNUT PUPOLJAK LESKE



SLIKA 4. ZARAŽENI I ZDRAV PUPOLJAK LESKE



SLIKA 5. LARVE ERIOFIDNE GRINJE U NAPADNUTOM PUPOLJKU

## **PREPORUKA**

POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE OBILAZAK ZASADA U CILJU UTVRĐIVANJA PRISUSTVA GRINJA. UKOLIKO SE U ZASADIMA REGISTRUJE NJIHOVO PRISUSTVO PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE NEKIM OD PREPARATA:

<b>PREPARAT</b>	<b>AKTIVNA MATERIJA</b>	<b>DOZA/KONCENTRACIJA</b>
VERTIMEC 018-EC, ABASTATE, KRAFT 1,8 EW, GAT VERTIS 1,8 CS	ABAMEKTIN	<b>0,15%</b>

**PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA OBAVEZNO SE TREBA PRIDRŽAVATI UPUTSTVA ZA UPOTREBU.**

**PAŽNJU TREBA OBRATITI I NA KOROVE KOJI SU PRISUTNI U VOĆNJACIMA I NA KOJIMA SE NALAZE PČELE I DRUGI POLINATORI. PRE PRIMENE INSEKTICIDA, TREBA UNIŠTITI CVETAJUĆE KOROVE U ZASADIMA I OKO NJIH.**