

O STANJU U ZASADIMA VINOVE LOZE

FENOFAZE VINOVE LOZE

NA PODRUČJU VOJVODINE VINOVA LOZA SE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA NALAZI U FAZI OD BOBICE VELIČINE ZRNA GRAŠKA-GROZDOVI OBEŠENI DO POČETAK DODIRIVANJA BOBICA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA VINOVE LOZE, SORTA ŠARDONE

PEPELJASTI GROŽĐANI MOLJAC (*Lobesia botrana*)

PEPELJASTI GROŽĐANI MOLJAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI GROŽĐA U NAŠIM USLOVIMA. U ZAVISNOSTI OD REGIONA, RAZVIJA TRI DO ČETIRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETNI STADIJUM SU LARVE KOJE NAKON PILJENJA UPREDAJU CVASTI VINOVE LOZE UNUTAR KOJIH SE HRANE. LARVE PRVE GENERACIJE HRANE SE CVETOVIMA, A LARVE KASNIJIH GENERACIJA OŠTEĆUJU BOBICE. MESTA OŠTEĆENJA PREDSTAVLJAJU ULAZNE RANE ZA PATOGENE PRE SVEGA ZA SIVU TRULEŽ GROŽĐA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA VINOGRADA REGISTRUJE SE PRISUSTVO JAJA I TEK ISPIJENIH LARVI NA GROZDOVIMA. NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE POČETAK PILJENJA LARVI DRUGE GENERACIJE PEPELJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA.



SLIKA 2. JAJE PEPELJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA NA BOBICI



SLIKA 3. LARVA PEPELJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA I SIMPTOM UBUŠENJA U BOBICU

PREPORUKA

U PERIODU POČETKA PILJENJA LARVI PEPELJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA SA OVICIDNO- LARVICIDNIM DELOVANJEM:

PREPARAT	AKTIVNAMATERIJA	KONCENTRACIJA
CORAGEN 20 SC	HLORANTRANILIPROL	0,018%

PLAMENJAČA VINOVE LOZE (*Plasmopara viticola*)
PEPELNICA VINOVE LOZE (*Uncinula necator*)

U PRETHODNIM EMISIJAMA OBAVEŠTAVALI SMO VAS O POVOLJNIM USLOVIMA ZA RAZVOJ GLJIVA KOJE PROUZROKUJU PLAMENJAČU I PEPELNICU VINOVE LOZE I O MERAMA ZAŠTITE KOJE JE BILO POTREBNO SPROVESTI. U NEADEKVATNO ŠTIĆENIM ZASADIMA REGISTRUJE SE PRISUSTVO SIMPTOMA OBA PATOGENA.

USLOVI U KOJIMA SE PROIZVODNJA TRENUTNO ODVIJA ODLIKUJU VEOMA VISOKE DNEVNE TEMPERATURE I ODSUSTVO PADAVINA ŠTO NISU POVOLJNI PARAMETRI ZA RAZVOJ PROUZROKOVAČA BOLESTI. MEĐUTIM, TOKOM NOĆI REGISTRUJU SE TEMPERATURE OD 15 DO 20°C I VISOKE RELATIVNE VLAGE VAZDUHA ŠTO STVARA POVOLJNE USLOVE ZA DALJI RAZVOJ I ŠIRENJE PATOGENA. STOGA, U VINOGRADIMA JE NEOPHODNO NASTAVITI ZAŠTITU VINOVE LOZE OD PROUZROKOVAČA PLAMENJAČE I PEPELNICE VINOVE LOZE.



SLIKA 4. SIMPTOM PEPELNICE NA GROZDU
PREPORUKA

ZA ZAŠTITU VINOVE LOZE OD PROUZROKOVAČA BOLESTI PREPORUČUJE SE SLEDEĆA KOMBINACIJA FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
PERGADO F 45	FOLPET+MANDIPROPAMID	2-2,5 KG/HA
+		
CANTUS	BOSKALID	1-1,2 KG/HA