

O STANJU U USEVIMA ŠEĆERNE REPE I POTREBI SPROVOĐENJA MERA ZAŠTITE

..

FAZE ŠEĆERNE REPE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ŠEĆERNE REPE SE NALAZE U FAZI RAZVIĆA KORENA.

PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE (*Cercospora beticola*)

PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE JAVLJA SE SVAKE GODINE NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU I UTIČE NA PRINOS KORENA I SADRŽAJ ŠEĆERA.

U BORBI PROTIV OVE BOLESTI NAJŠIRE SU UKLJUČENE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE. U POSLEDNJIH DESETAK GODINA UKLJUČUJU SE I SORTE RAZLIČITOG NIVOA TOLERANCIJE PREMA OVOM PATOGENU. TAKOĐE, USLOVI U KOJIMA SE ODVIJA PROIZVODNJA REPE IMAJU ZNAČAJNU ULOGU U RAZVOJU OVE GLJIVE. SVE OVE OKOLNOSTI DOVODE DO DIFERENCIRANOG PRISTUPA U ZAŠTITI ŠEĆERNE REPE OD PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LISTA.

U DOSADAŠNJEM MONITORINGU USEVA ZAŠTITA JE SPROVEDENA NA PARCELAMA NA KOJIMA JE NIVO INFEKCIJE DOSTIGAO PRVI, ODNOSNO DRUGI EPIDEMIJSKI PRAG.

S OBZIROM NA NEDOSTATAK PADAVINA, NISKU RELATIVNU VLAGU VAZDUHA KAO I IZUZETNO VISOKE TEMPERATURE, PROCES UMNOŽAVANJA SIMPTOMA KAO I INFEKTIVNOG POTENCIJALA TEKAO JE SPORIJE. U OVIM USLOVIMA, SA DIFERENCIRANIM PRISTUPOM I PRAĆENJEM PRAGOVA ZA SPROVOĐENJE MERA, NA POJEDINIM PARCELAMA SPROVEDEN JE JEDAN TRETMAN ZAŠTITE, DOK JE NEKIM PARCELAMA SPROVEDEN I DRUGI HEMIJSKI TRETMAN.



SLIKA 1. SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE



SLIKA 2. SPORULISANA PEGA *Cercospora beticola*

PREPORUKA

USLOVI KOJI SU REGISTROVANI POSLEDNJIH DANA NA PODRUČJU VOJVODINE, DOPRINEĆE DALJEM RAZVOJU PEGAVOSTI LISTA. NA PROIZVODNIM REGIONIMA ZABELEŽENO JE OD PAR LITARA DO PREKO 30 LITARA KIŠE. TEMPERATURNE VREDNOSTI U KOMBINACIJI SA REGISTROVANIM PADAVINAMA STVARAJU RIZIK ZA DALJE ŠIRENJE PATOGENA.

PREPORUČUJE SE KONTROLA USEVA ŠEĆERNE REPE. U ZAVISNOSTI OD ZADNJEG MOMENTA ZAŠTITE I USLOVA NA KONKRETNOJ PARCELI, DONETI ODLUKU O DALJIM MERAMA ZAŠTITE.

NEOPHODNO JE KONSULTOVATI STRUČNE SEKTORE PROGNOZNE SLUŽBE I FABRIKA ŠEĆERA NA TERENU, OKO VREMENA NOVOG TRETMANA KAO I IZBORA FUNGICIDA.