

Zelena prognoza za 28.8.2019. - O BRESKVINOM I JABUKINOM SMOTAVCU

BRESKVIN SMOTAVAC (*Cydia molesta*) I JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)

BRESKVIN I JABUKIN SMOTAVAC SU VEOMA ZNAČAJNE ŠTETOČINE U NAŠOJ VOĆARSKOJ PROIZVODNJI.

BRESKVIN SMOTAVAC NAJVEĆE ŠTETE PRIČINJAVA U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA, A U NEDOSTATKU OVIH VOĆNIH VRSTA MOŽE PROUZROKOVATI ŠTETE I NA ŠLJIVAMA, KAJSIJAMA, JABUKAMA, KRUŠKAMA I DUNJAMA. JABUKIN SMOTAVAC PORED JABUKE NAJVEĆE ŠTETE PROUZROKUJE U U ZASADIMA KRUŠAKA I DUNJA.



SLIKA 1. ODRASLA JEDINKA BRESKVINOG SMOTAVCA



SLIKA 2. ODRASLA JEDINKA JABUKINOG SMOTAVCA

LARVE OVIH ŠTETOČINA UBUŠUJU SE U PLODOVE VOĆA. ISHRANJUJUĆI SE MESOM PLODA, PLODOVE PRLJAJU IZMETOM I DOLAZI DO NJIHOVOG PREVREMENOG OPADANJA. NAPADNUTI PLODOVI SU PODLOŽNI INFEKCIJAMA RAZLIČITIH VRSTA PATOGENA I GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.



SLIKA 3. LARVA BRESKVINOG SMOTAVCA



SLIKA 4. LARVA JABUKINOG SMOTAVCA

U ZAVISNOSTI OD TEMPERATURE, U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA, BRESKVIN I JABUKIN SMOTAVAC MOGU RAZVITI DO ČETIRI GENERACIJE GODIŠNJE. NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE PILJENJE LARVI ČETVIRTE GENERACIJE BRESKVINOG SMOTAVCA I POČETAK LETA ČETVIRTE GENERACIJE JABUKINOG SMOTAVCA. POČETAK POLAGANJA JAJA JABUKINOG SMOTAVCA, NA VEĆINI REGIONA, OČEKUJE SE KRAJEM OVE I POČETKOM SLEDEĆE NEDELJE.



SLIKA 5. JAJE BRESKVINOG SMOTAVCA PRED PILJENJE

PREPORUKA

U CILJU SPREČAVANJA UBUŠIVANJA LARVI BRESKVINOG I JABUKINOG SMOTAVCA, U ZASADIMA JABUKA SA KASNIM SORTIMENTOM I U ZASADIMA DUNJA, PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
AVAUNT 15 EC	INDOKSAKARB	0,03-0,05 %
AFFIRM OPTI	EMAMEKTIN-BENZOAT	2 KG/HA

TREBA VODITI RAČUNA O KARENCI PRIMENJENIH PREPARATA, KOJA ZA NAVEDENE INSEKTICIDE U ZASADIMA JABUKE IZNOSI 7 DANA. SPROVOĐENJE TRETMANA SE PREPORUČUJE U VEČERNJIM SATIMA. U ZASADIMA GDE JE U TOKU BERBA NE PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE.