

## O KUPUSNOJ MUVI, VAŽNOJ ŠTETOČINI U PROIZVODNJI KUPUSNJAČA

### FENOFAZE KUPUSA

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE RASAĐIVANJE RANIH KUPUSNJAČA.

### KUPUSNA MUVA (*Delia radicum*)

U POČETNIM FAZAMA RAZVOJA, VELIKE ŠTETE NA USEVIMA KUPUSNJAČA, MOŽE PROUZROKOVATI KUPUSNA MUVA. OVA ŠTETOČINA IMA DVE DO TRI GENERACIJE GODIŠNJE, A NAJVEĆE ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE PRVE GENERACIJE NA USEVIMA RANIH KUPUSNJAČA. ODRASLE JEDINKE MUVA POJAVLJUJU SE KADA JE TEMPERATURA ZEMLJIŠTA OKO 12°C I POLAŽU JAJA NA KORENOV VRAT KUPUSA ILI U ZEMLJU NEPOSREDNO OKO BILJKE. ISPILJENE LARVE SE U POČETKU HRANE KORENOVIM DLAČICAMA, A KASNIJE PRODIRU U KOREN KUPUSA I OMETAJU NORMALNO CIRKULISANJE SOKOVA. NAPADNUTE BILJKE MENJAJU BOJU I POSTAJU PLAVOLJUBIČASTE, A KADA JE NAPAD VEĆI POSTAJU BLEDE I SUŠE SE. MLADE BILJKE MOGU BITI UNIŠTENE OD SAMO JEDNE LARVE.

### STANJE U USEVIMA KUPUSA

NA FEROMONSKIM KLOPKAMA U USEVIMA KUPUSA REGISTRUJE SE ULOV ODRASLIH JEDINKI KUPUSNE MUVE. VIZUELNIM PREGLEDOM TEK RASAĐENIH BILJAKA UOČENA SU POLOŽENA JAJA OKO KORENOVOG VRATA.



SLIKA 1. ODRASLA JEDINKA KUPUSNE MUVE



SLIKA 2. ODRASLA JEDINKA KUPUSNE MUVE



SLIKA 3. JAJE KUPUSNE MUVE NA ZEMLJI PORED RASAĐENE BILJKE KUPUSA

## PREPORUKA

S OBZIROM DA JE U TOKU LET KUPUSNE MUVE, U USEVIMA KUPUSNJAČA, ODMAH PO RASAĐIVANJU, PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA U CILJU SUZBIJANJA IMAGA I SPREČAVANJA POLAGANJA JAJA. PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
BIFENICUS, FOBOS-EC	BIFENTRIN	0,2-0,3 L/HA