

Zelena prognoza za 25.4.2019. - O VAŠIMA U VOĆNIM ZASADIMA

BILJNE VAŠI (*Aphididae*)

BILJNE VAŠI SU NAJRASPROSTRANJENIJA PORODICA KRILATIH INSEKATA. U NAŠOJ ZEMLJI REDOVNO SU PRISUTNE U VOĆNIM ZASADIMA PRAVEĆI DIREKTNE I INDIREKTNE ŠTETE. DIREKTNE ŠTETE NASTAJU KAO POSLEDICA NJIHOVE ISHRANE. USLED SISANJA BILJNIH SOKOVA DOLAZI DO DEFORMACIJE, ZAOSTAJANJA U PORASTU I SUŠENJA I PROPADANJA BILJNIH ORGANA. INDIREKTNE ŠTETE NASTAJU USLED LUČENJA MEDNE ROSE NA KOJU SE NASELJAVA GLJIVA ČAĐAVICA. PORED NAVEDENOG VAŠI SU I PRENOSIOCI VELIKOG BROJA BILJNIH VIRUSA.

TRENTUTNO SE U NAŠIM VOĆNIM ZASADIMA REGISTRUJE PRISUSTVO RAZLIČITIH VRSTA VAŠI:

- ZELENA BRESKVINA VAŠ (*Myzus persicae*)
- LISNA VAŠ CRVENIH GALA JABUKE (*Dysaphis devecta*)
- CRNA TREŠNJINA LISNA VAŠ (*Myzus cerasi*)

ZELENA BRESKVINA LISNA VAŠ (*Myzus persicae*)

ZELENA BRESKVINA VAŠ SPADA U RED EKONOMSKI VEOMA ZNAČAJNIH ŠTETOČINA NE SAMO ZA BRESKVU VEĆ I ZA MNOGE DRUGE POLJOPRIVREDNE KULTURE. OVA VRSTA PREZIMLJAVA NA BRESKVI, ALI SE TOKOM LETA RAZVIJA NA PREKO 400 BILJNIH KULTURA. ŠTETE PRIČINJAVA SISAJUĆI SOKOVE BILJAKA DOMAĆINA NA NALIČJU LIŠĆA I VRHOVIMA MLADIH LASTARA. NAPADNUTO LIŠĆE SE UVIJA, A LASTARI ZAOSTAJU U PORASTU. JAK NAPAD IZAZIVA SLABLJENJE ČITAVE VOĆKE, ŠTO SE NEPOVOLJNO ODRAŽAVA NA PORAST I SAZREVANJE PLODOVA. OBILJE MEDNE ROSE KOJU LUČI OVA VAŠ, PREDSTAVLJA IDEALNU PODLOGU ZA RAZVOJ GLJIVE ČAĐAVICE. ZELENA BRESKVINA VAŠ JE VEKTOR PREKO 80 BILJNIH VIRUSA VEOMA OPASNIH ZA BILJNU PROIZVODNJU. ZA KOŠTIČAVE VOĆNE VRSTE VEOMA JE ZNAČAJNA NJENA ULOGA KAO VEKTORA VIRUSA ŠARKE ŠLJIVE.

TRENTUTNO SE U ZASADIMA BRESAKA REGISTRUJU BESKRILNE JEDINKE I NJIHOVE KOLONIJE.



SLIKA 1. ZELENA BRESKVINA VAŠ

LISNA VAŠ CRVENIH GALA JABUKE (*Dysaphis devecta*)

VIZUELIM PREGLEDIMA ZASADA JABUKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO LISNE VAŠI CRVENIH GALA JABUKE. USLED NJIHOVE ISHRANE DOLAZI DO DEFORMISANJA I UVIJANJA LISTOVA PREMA NALIČIJU, DOK SE NA LICU LISTA POJAVLJUJE INTENZIVNO CRVENA BOJA. U SLUČAJU JAČEG NAPADA SIMPTOMI OŠTEĆENJA POJAVLJUJU SE I NA PLODOVIMA.



SLIKA 2. VAŠI NA NALIČJU LISTA



SLIKA 3. VAŠI NA NALIČJU LISTA

CRNA TREŠNJINA LISNA VAŠ (*Myzus cerasi*)

VIZUELNIM PREGLEDIMA, U POJEDINIM ZASADIMA VIŠANJA I TREŠANJA, REGISTROVANO JE PRISUSTVO CRNE TREŠNJINE LISNE VAŠI. VAŠI SE NALAZE NA LIŠĆU I VRHOVIMA MLADARA GDE SE HRANE SISANJEM BILJNIH SOKOVA. USLED ISHRANE DOLAZI DO POVIJANJA LIŠĆA, A PRI JAČEM NAPADU I DO LUČENJA MEDNE ROSE NA KOJU SE NASELJAVA GLJIVA ČAĐAVICA.



SLIKA 4. CRNA TREŠNJINA LISNA VAŠ



SLIKA 5. CRNA TREŠNJINA LISNA VAŠ

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED VOĆNIH ZASADA NA PRISUSTVO BILJNIH VAŠI. UKOLIKO SE REGISTRUJE PRISUSTVO OVIH ŠTETOČINA PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA.