

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O SPROVOĐENJU MERA ZAŠTITE U ZASADIMA KRUŠAKA

FAZE KRUŠAKA

NA PODRUČJU VOJVODINE KRUŠKE SE, U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA I LOKALITETA, NALAZE U FAZI OD PRECVETAVANJA DO FAZE POČETAK RAZVOJA PLODA.



SLIKA 1: FAZA RAZVOJA KRUŠKE

OBIČNA KRUŠKINA BUVA (*Cacopsylla pyri*)

OBIČNA KRUŠKINA BUVA JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA KRUŠKE NA NAŠEM PODRUČJU. GLAVNI JE PROBLEM U INTENZIVNOJ PROIZVODNJI KRUŠAKA. ŠTETE NANOSE LARVE KOJE SISAJU SOKOVE BILJAKA, A VIŠAK HRANE IZLUČUJU U VIDU MEDNE ROSE NA KOJU SE NASELJAVA GLJIVA ČAĐAVICA. ČAĐAVI BILJNI DELOVI SMANJUJU ASIMILACIONU POVRŠINU

ŠTO SE ODRAŽAVA NA SMANJENJE PRINOSA, A ČAĐAVI PLODOVI IMAJU MANJU TRŽIŠNU VREDNOST.




SLIKA 2: ŠTETE OD OBIČNE KRUŠKINE BUVE

STANJE U ZASADIMA KRUŠAKA

TRENTNO JE U TOKU POČETAK RAZVOJA PRVE LETNJE GENERACIJE OBIČNE KRUŠKINE BUVE. VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA KRUŠAKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO TEK EKLODIRANOG NESKELETIRANOG IMAGA. S OBZIROM NA PROGNOZIRANE TEMPERATURE, U NAREDNIM DANIMA SE OČEKUJE MASOVAN IZLAZAK IMAGA KAO I POČETAK POLAGANJA JAJA.

U OVOM MOMENTU VEOMA JE VAŽNO SPREČITI DALJI RAZVOJ ODRASLIH JEDINKI, NJIHOVU KOPULACIJU I POLAGANJE JAJA.



SLIKA 3: IMAGO OBIČNE KRUŠKINE BUVE

PREPORUKA

U ZASADIMA KRUŠAKA, ZA SUZBIJANJE OBIČNE KRUŠKINE BUVE, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
CIPKORD 20 EC, CIPRAZOR 20 EC, CRNA MAMBA	CIPERMETRIN	0,015-0,03%
GROM	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,3-0,5 L/HA

PRIMENA INSEKTICIDA U FAZAMA CVETANJA JE ZABRANJENA!

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM