

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU
PROGNOZU“
VEČERAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U ZASADIMA LESKE

FENOFAZE LESKE

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI LESKE SE NALAZE U FAZI RAZVOJA PLODA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA LESKE

LEŠNIKOV SURLAŠ (*Curculio nucum*)

LEŠNIKOV SURLAŠ JE NAJZAČAJNIJA ŠTETOČINA LESKE NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU. U FAZAMA RAZVOJA PLODA ŽENKE LEŠNIKOVOG SURLAŠA, NAKON DOPUNSKE ISHRANE NA LIŠĆU, BUŠE PLOD I U NJEGA POLAŽU JAJA. NAKON PILJENJA, LARVE SE ISHRANJUJU JEZGROM PLODA KOJI GUBI TRŽIŠNU VREDNOST.



SLIKA 2. IMAGO LEŠNIKOVOG SURLAŠA

PREPORUKA

UKOLIKO SE PREGLEDOM ZASADA REGISTRUJE PRISUSTVO LEŠNIKOVOG SURLAŠA, U CILJU SPREČAVANJA POLAGANJA JAJA U PLODOVE, PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE INSEKTICIDOM:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
KARATE ZEON	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,2 L/HA

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA REGISTROVANO JE I PRISUSTVO LISNE VAŠI LESKE. USLOVI U PROIZVODNJI IZUZETNO POGODUJU RAZVOJU OVIH ŠTETOČINA. INSEKTICID ZA SUZBIJANJE LEŠNIKOVOG SURLAŠA DELOVAĆE I NA SUZBIJANJE VAŠI.



SLIKA 3. LISNA VAŠ LESKE

PEPELNICA LESKE (*Phyllactinia guttata*)

PEPELNICA LESKE JE EKONOMSKI ZNAČAJNA BOLEST LESKE. NA NALIČJU LISTA FORMIRA SE BELIČASTA NAVLAKA OD REPRODUKTIVNIH ORGANA OVE GLJIVE. ZARAŽENI LISTOVI NAJPRE POČINJU DA ŽUTE, KASNIJE DOBIJAJU BRAONKASTU BOJU, A NA POSLETKU OPADAJU. TRENUTNI USLOVI U PROIZVODNJI POGODUJU RAZVOJU OVOG PATOGENA.



SLIKA 4. SIMPTOM PEPELNICE LESKE

PREPORUKA

U CILJU ZAŠTITE OD PROUZROKOVAČA PEPELNICE LESKE, PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PRIMENA FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
IMAGE	PIRAKLOSTROBIN	1 L/HA

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM