

## **O stanju i potrebi preduzimanja mera zaštite u zasadima višanja i trešanja**

---

### **FAZE VIŠANJA I TREŠANJA**

U ZASADIMA VIŠANJA I TREŠANJA ZAVRŠENA JE BERBA. NAKON UBIRANJA PLODOVA NE TREBA PRESTATI SA MERAMA ZAŠTITE PROTIV NAJZNAČAJNIJEG PATOGENA OVIH ZASADA – PROUZROKOVAČA OSPIČAVOSTI LIŠĆA VIŠNJE I TREŠNJE.

### **OSPIČAVOST LIŠĆA VIŠNJE I TREŠNJE (*Blumeriella jaapii*)**

OSPIČAVOST LIŠĆA VIŠNJE I TREŠNJE JE BOLEST KOJA SE U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA JAVLJA SVAKE GODINE, TE JE I U OVOJ PROIZVODNOJ SEZONI ZABELEŽENO NJENO PRISUSTVO U VOĆNJACIMA.

POČETNI SIMPTOMI KOJE OVAJ PATOGEN PROUZROKUJE SU SITNE PURPURNE PEGE NA LICU LISTA. U VLAŽNIM USLOVIMA NA NALIČJU LISTA JAVLJA SE BELIČASTA NAVLAKA KOJU ČINE KONIDIJE GLJIVE. KOD JAČIH ZARAZA LIŠĆE POŽUTI I OPADA.

USLED PREVREMENE DEFOLIJACIJE FORMIRA SE MANJE RODNIH PUPOLJAKA ZA NAREDNU GODINU, A MOŽE DOĆI I DO RETROVEGETACIJE ŠTO DOVODI DO IZNURIVANJA VOĆKE PA ONA TEŽE PODNOSI NISKE TEMPERATURE U TOKU ZIME.



SLIKA1-SIMPTOMI PEGAVOSTI LIŠĆA



SLIKA2-SIMPTOMI PEGAVOSTI LIŠĆA

U OVOJ SEZONI VLADALI SU OPTIMALNI USLOVI ZA RAZVOJ OVE GLJIVE A TO SU TEMPERATURE OD 15- 20<sup>0</sup>C, PADAVINE I VISOKA VLAŽNOST VAZDUHA. U TAKVIM USLOVIMA SA NALIČJA LISTA U OKVIRU PEGA, FORMIRA SE BELIČASTA NAVLAKA OD KONIDIJA GLJIVE KOJE SE PUTEK KIŠA I VAZDUŠNIH STRUJA ŠIRE OD LISTA DO LISTA. TAKO SE SEKUNDARNE INFEKCIJE OD KONIDIJA PONAFLJAJU U ZASADU SVE DO JESENI. OVA GLJIVA UPRAVO I PREZIMLJAVA U OPALOM LIŠĆU PA NAREDNE SEZONE TO JE IZVOR NOVIH INFEKCIJA.

SADA, KADA JE BERBA ZAVRŠENA I DALJE POSTOJI POTREBA ZA SUZBIJANJEM PEGAVOSTI LIŠĆA VIŠNJE I TREŠNJE.

### **PREPORUKA**

PREPORUKA PROIZVOĐAČIMA JE DA NAKON BERBE IZVRŠE TRETMAN FUNGICIDIMA U CILJU ZAŠTITE LISNE MASE NEKIM OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
AGRODIN 65 WP	DODIN	0,1%
DELAN 700 WG	DITIANON	0,075%

.....