

## Zelena prognoza za 30.4.2019. - O STANJU U ZASADIMA JABUKA

### FENOFAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI JABUKA SE NALAZE U FAZI RAZVOJA PLODOVA, PLODOVI DOSTIGLI DIMENZIJE OD 10 DO 20 MM (BBCH 71-72).



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKA

### ČAĐAVA PEGAVOST LISTA I KRSTAVOST PLODOVA JABUKE (*Venturia inaequalis*)

ČAĐAVA PEGAVOST LISTOVA I KRSTAVOST PLODOVA JE NAJZNAČAJNIJE OBOLJENJE U PROIZVODNJI JABUKA U NAŠIM USLOVIMA. STRATEGIJA ZAŠTITE JABUKA OD OVOG PATOGENA ZASNIVA SE NA SPREČAVANJU PRIMARNIH INFEKCIJA. NA CELOM PODRUČJU VOJVODINE PERIOD PRIMARNIH ZARAŽENJA JE JOŠ UVEK U TOKU, ODNOSNO U ZASADIMA JABUKA SE JOŠ UVEK REGISTRUJE PRISUSTVO ASKOSPORA U OPALOM LIŠĆU IZ PRETHODNE GODINE. SA SVAKIM PADAVINAMA POSTOJI RIZIK OD OSLOBAĐANJA ASKOSPORA I OSTVARENJA INFEKCIJA. TRENUTNI USLOVI SA UČESTALIM PADAVINAMA UPUĆUJU NA NEOPHODNOST ZAŠTITE JABUKE OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTOVA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE.



SLIKA 2. ASKUSI SA ASKOSPORAMA



SLIKA 3. SIMPTOMI ČAĐAVE PEGAVOSTI NA LISTU JABUKE (IZ PRETHODNE VEGETACIJE)



**SLIKA 4. SIMPTOM ČAĐAVE KRASTAVOSTI NA PLODU JABUKE (IZ PRETHODNE VEGETACIJE)  
PREPORUKA**

U PROTEKLOM PERIODU NA TERITORIJI VOJVODINE PALO JE PREKO 30 MM KIŠE I NE MOŽE SE VIŠE RAČUNATI NA DEJSTVO PREDHODNO NANETIH FUNGICIDA. ODMAH PO STABILIZACIJI VREMENSKIH USLOVA, PROIZVOĐAČIMA JABUKA SE PREPORUČUJE PRIMENA SLEDEĆE KOMBINACIJE FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
DELAN 700 WG, FIESTA, GALILEO	DITIANON	0,07%
+	+	+
PEHAR, PYRUS 400 SC	PIRIMETANIL	0,1%