

O šljivinom smotavcu

FAZE ŠLIVE

NA PODRUČJU VOJVODINE ŠLJIVE SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PLODOVA, OD FAZE PLODOVI DOSTIGLI 70% KRAJNJE VELIČINE DO FAZE POČETKA OBOJAVANJA PLODOVA.



SLIKA1-FAZA RAZVOJA ŠLJIVA

ŠLJIVIN SMOTAVAC (*Grapholita funebrana*)

U OVIM FAZAMA RAZVOJA PLODOVA, VAŽNO JE OBRATITI PAŽNJU NA NAJZNAČAJNIJU ŠTETOČINU ŠLJIVE-ŠLJIVINOG SMOTAVCA.

OVA ŠTETOČINA U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE I HRANE SE MESOM PLODA. NAPADNUTI PLODOVI SE PREPOZNAJU PO SMOLOTOČINI KOJA CURI IZ NJIH I PO TOME ŠTO DOLAZI DO PREVREMENOG SAZREVANJA I OPADANJA PLODOVA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA ŠLJIVA REGISTROVANA SU JAJA OVE ŠTETOČINE NA PLODOVIMA. PORED SVEŽE POLOŽENIH JAJA REGISTRUJU SE I JAJA U ODMAKLIM FAZAMA RAZVOJA KAO I TEK ISPILJENE LARVE. U TOKU JE POČETAK PILJENJA LARVI DRUGE GENERACIJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA.



SLIKA2-SVEŽE POLOŽENO JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA

PREPORUKA

U CILJU SPREČAVANJA PILJENJA I UBUŠIVANJA LARVI ŠLJIVINOG SMOTAVCA, NEOPHODNO JE SPROVESTI MERE ZAŠTITE INSEKTICIDIMA.

U OVOM PERIODU PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA OVICIDNO-LARVICIDNOG DELOVANJA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
CORAGEN 20-SC	HLORANTRANILIPROL	0,016-0,02%

.....